

حالة سريرية خاصة في انسداد مخرج المعدة

د يوسف جرّاد

القصة المرضية

- المريض ؟ ٦٥ سنة ريف حماه راعي غنم مدخن
غ ك
- راجع بقصة اقياء لكل وارد مع نقص وزن و
شهية مع الم بطني شرسوفي يزداد بالطعام دون
حرارة
- لا سوابق مرضية ذات أهمية
- بالفحص مضض شرسوفي متوسط الشدة مع
ملاحظة نقص بالسمع

مخبريا

• MCV :76 HB :10,5 باقي التعداد

طبيعي

• مشعرات صفراوية طبيعية


• ESR: 35 CRP: 23

• سكر بولة كرياتينين طبيعية

شعاعيا

- إيكو بطن لوحظ ثمالة كبيرة بالمعدة رغم الصيام سماكة في جدار المعدة ضخامة بروتات حميدة والباقي طبيعي
- ملاحظة : لا توسع بالطرق الصفراوية داخل او خارج الكبد البنكرياس طبيعي رأس وجسم وذيل

تنظير معدة



GGG.mp4 •





CT scan



CT scan



CT scan




التشريح المرضي

التهاب مزمن

غير نوعي


توسيع بالبالون



HHH.mp4 •

- بعد التوسيع حالة عامة مستقرة لا الم بطني
- لكن بعد البدء بإدخال السوائل والطعام
- عودة الشكوى من جديد
- التوصية بإجراء صورة ظليلة لمعرفة نتائج التوسيع السابق

صورة ظليلة للمعدة



صورة ظليلة للمعدة









von Recklinghausen's disease







von Recklinghausen's disease GIST

بحث

Google

Gastrointestinal stromal tumor (GIST), is a gastrointestinal complication of type 1 neurofibromatosis (NF1) (von Recklinghausen's disease)


**Distinctively,
multiple GISTs arose
preferentially in the
small intestine**

فتح بطن






Distinctively, multiple GISTs arose preferentially in the small intestine




Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a hereditary cancer predisposition syndrome characterized by

neurologic



orthopedic



Dermatologic manifestations



There is a spectrum of tumors that affects individuals with NF1 at an increased incidence compared to the general population •

such as neurofibromas, malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST) and gliomas •

There has been a growing number of reporting an association between NF1 and gastrointestinal stromal tumors (GIST) •

**NF1-associated GIST has been described •
to comprise a minority of cases, in which
there is an alternative molecular
pathogenesis.**

**This difference between NF1-related •
GISTs and that of the general
population has important
therapeutic implications .**

**The presence of kinase mutations •
has been shown to be predictive of
clinical response to imatinib, a
tyrosine kinase inhibitor**

العبارة

von Recklinghausen's disease





A



B



بيكفي تكون هياك



- لحتى تلاحظ انو المريض مصاب
بمتلازمة

- **von Recklinghausen's disease**

- و الاصابة المعوية احتمال كبير تكون

GIST

شكرا لا صغائكم